

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

АнгиоНорм®

Регистрационный номер: ЛС-001137

Торговое наименование: АнгиоНорм®

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав:

Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

Активный компонент: АнгиоНорм® экстракт сухой (получаемый из смеси лекарственного растительного сырья - боярышника плоды, солодки корни, каштана конского семени, шиповника плоды с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на авикулярин 0,50 мг) - 100 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 57,00 мг, крахмал картофельный - 89,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 1,00 мг, стеариновая кислота - 3,0 мг.

Оболочка, полученная методом наращения: сахароза - 141,10 мг, магния гидроксикарбонат - 27,64 мг, кремния диоксид коллоидный - 2,20 мг, титана диоксид - 2,70 мг, повидон низкомолекулярный - 2,20 мг, тальк - 1,90 мг, краситель тропеолин-О - 0,06 мг.

Мастика для глянцеваия: воск пчелиный - 0,10 мг, парафин жидкий - 0,10 мг.

Описание:

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, на поперечном разрезе: оболочки желтого и белого цветов и ядро от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, допускаются светлые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторное средство.

Код АТХ C05C

Фармакологические свойства

АнгиоНорм® обладает выраженной антиагрегационной, антитромбоцитарной активностью, ангиопротекторными и противовоспалительными свойствами, оказывает венотонизирующее и улучшающее микроциркуляцию действие, активизирует диуретическую функцию почек.

АнгиоНорм® оказывает влияние на общее состояние организма: повышает физическую работоспособность, проявляет стресс-протективную активность и умеренный противоболевой эффект.

Показания к применению

В составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся сосудистыми нарушениями, такими как повышение агрегации тромбоцитов (тромбозы, тромбоэмболии), нарушение проницаемости капилляров и микроциркуляции (тромбозы капилляров), нарушение венозного кровообращения (варикозное расширение вен, посттромботический синдром, тромбозы).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые хронические заболевания печени, почек и желудочно-кишечного тракта с нарушением их функций. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (из-за наличия лактозы и сахарозы). Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Следует соблюдать осторожность при применении препарата лицам с бронхиальной астмой, гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

АнгиоНорм® принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день через 40 минут после еды. Продолжительность курса лечения до 3-х недель. Возможно увеличение разовой дозы препарата до 2-х таблеток 3 раза в день в случае хорошей переносимости. Необходимость проведения повторного курса определяется врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Аллергические реакции, диспептические расстройства.

В случае возникновения нежелательных реакций при применении препарата необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

При длительном применении АнгиоНорма® в дозах, превышающих рекомендованную суточную дозу, возможно развитие гипокалиемии, повышение артериального давления, появления периферических отеков. Лечение симптоматическое.

В случае возникновения явлений передозировки препарата необходимо срочно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение АнгиоНорма® можно сочетать с другими лекарственными средствами: гипополипидемическими, противовоспалительными, болеутоляющими средствами, антибиотиками, антикоагулянтами прямого и непрямого действия.

Особые указания

При самостоятельном применении препарата не следует превышать максимальные сроки и рекомендуемые дозы, указанные в инструкции.

При отсутствии уменьшения симптомов заболевания или при утяжелении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом: в одной таблетке содержится 0,023 хлебных единиц (ХЕ), в максимальной суточной дозе – 0,138 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортом и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 30 таблеток в банки полимерные из полипропилена для хранения лекарственных средств и витаминов или в банки полимерные из полипропилена с контролем первого вскрытия и амортизатором.

3, 7, или 10 контурных ячейковых упаковок или 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре от 15°C до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

АО "Отсифарм", Россия,
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
Эт. 12, пом. II, ком.29
Тел.: +7 (800) 775-98-19
Факс: +7 (495) 221-18-02
www.otcpharm.ru

Производитель

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия, 249096,
Калужская обл., Малоярославецкий район,
г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д.115.